



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA  
Pri hrastu 18, 5000 NOVA GORICA  
Tel. :++ 386/05-3351200  
Faks:++386/05-3351260

Datum: 06/05/2011

## Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 06. maj 2011

### ŠKROPLJENJE BRESKEV IN NEKTARIN

V nasadih moramo biti pozorni na pojav **listnih uši**. V primeru, da je prag škodljivosti presežen, lahko uporabimo sledeče pripravke: **Chess 50 WP v 0,02% konc.**, **Confidor SL 200 v 0,025% konc.**, **Kohinor SL 200 v 0,025% konc.**, **Teppeki v 0,14kg/ha**, **Mospilan 20 SG v 0,025-0,04% konc.**, **Calypso SC 480 v 0,3l/ha.**, **Actara 25 WG v 0,1-0,125kg/ha** ali **Pirimor 50 WG v 0,04-0,06% konc.**

Breskov zavijač se v zadnjem tednu v velikem številu lovi na feromonske vabe, vendar zaradi nizkih temperatur v večernem času, ni pogojev za odlaganje jajčec. Škropljenje bo potrebno opraviti, ko se bodo večerne temperature dvignile nad prag 15 °C.

**Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.**

Zaradi suhega vremena ni nevarnosti za pojav **breskovega škrlupa**. Škropljenje svetujemo pred naslednjim napovedanim dežjem. V ta namen lahko uporabimo pripravke: **Syllit v 0,16% konc.**, **Kumulus DF** ali **Thiovit Jet v 0,3% koncentraciji**.

### ŠKROPLJENJE ČEŠENJ IN VIŠENJ

V nasadih češenj in višenj pozorno spremljajte pojav **črne češnjeve uši**. Preg škodljivosti je 3% napadenih poganjkov.

Uporabite lahko sredstva: **Neemazal T/S v 0,15% konc.**, **Confidor 200 SL** ali **Kohinor 200 SL** v količini **0,5 l/ha** ter **Calypso SC 480** v količini **0,375 l/ha**.

**Nekatera navedena sredstva so čebelarjem nevarna, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.**

### ČEŠPLJE IN SLIVE

V nasadih češpelj in sliv bodite pozorni na pojav zelene in mokaste češpljeve uši. V kolikor je prag škodljivosti presežen, lahko uporabite naslednje pripravke: **Confidor 200 SL** ali **Kohinor 200 SL** v

**0,025 % konc., Mospilan 20 SG v 0,025- 0,04% konc.. ali Pirimor 50 WG v 0,04 – 0,06 % konc..**

**Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.**

*Pripravila: Mojca Rot*