



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA  
Pri hrastu 18, 5000 NOVA GORICA  
Tel. :++ 386/05-3351200  
Faks:++386/05-3351260

Datum: 07/04/2011

## Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 07. aprila 2011

### ŠKROPLJENJE BRESKEV IN NEKTARIN

V nasadih breskev, ki so **že odcvetele** moramo biti pozorni na pojav **listnih uši (predvsem na pojav rjave in črne breskove uši)**. V nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti, **škropimo po cvetenju**. Uporabimo lahko sledeče pripravke: **Chess 50 WP v 0,02% konc.**, **Confidor SL 200 v 0,025% konc.**, **Kohinor SL 200 v 0,025% konc.**, **Tepeki v 0,14kg/ha**, **Mospilan 20 SG v 0,025-0,04% konc.**, **Calypso SC 480 v 0,3l/ha.**, **Actara 25 WG v 0,1-0,125kg/ha** in **Pirimor 50 WG v 0,04-0,06% konc.**

**Po cvetenju**, ko odpadejo vsi cvetni listi, je pri nektarinah potrebno opraviti škropljenje proti **tripsom**. Za zatiranje tripsov lahko uporabimo pripravka **Confidor SL 200** ali **Kohinor SL 200 v 0,025% konc.** in v skladu z navodili. Pripravki delujejo tudi na listne uši.

**Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.**

### ŠKROPLJENJE MARELIC

V nasadih marelic pozorno spremljajte pojav **malega zimskega pedica**, ki obžira mlade lističe. Še posebej, če imamo nasad v bližini gozda, je potrebno malega zimskega pedica zatirati. Uporabimo lahko sredstvo **Neemazal T/S v 0,15% koncentraciji**. Sredstvo deluje na mlajše razvojne stadije gosenic.

**Omenjeno sredstvo ni strupeno za čebele, priporočamo pa, da z njim škropimo pod noč, ko na cvetovih ni čebel.**

### ŠKROPLJENJE ČEŠENJ IN VIŠENJ

V nasadih češenj, ki so **že odcvetele** pozorno spremljajte pojav **malega zimskega pedica**, ki obžira mlade lističe in plodiče češenj. Še posebej, če imamo nasad v bližini gozda, je potrebno malega zimskega pedica zatirati. Uporabimo lahko sredstvo **Neemazal T/S v 0,15% koncentraciji**. Sredstvo deluje na mlajše razvojne stadije gosenic.

**Omenjeno sredstvo ni strupeno za čebele, priporočamo pa, da z njim škropimo pod noč, ko na cvetovih ni čebel.**

Pripravil: dr. Ivan Žežlina

## HRUŠKE IN JABLANE

### Škrlup in jablanova pepelovka

Hruške in jablane sorte Idared so v večjem delu Primorske že polnem cvetenju, ostale sorte jablan začenjajo cveteti. Nasadi jablan v Brkinih in na Tolminskem so povečini še v fazi E, izjema je le sorta Idared, ki je že v balonskem stadiju (E2). Zaradi suhega vremena v zadnjem tednu ni bilo pogojev za okužbe s škrlupom, nove izbruhe askospor lahko pričakujemo ob prvem naslednjem dežju.

Priporočamo, da še naprej izvajate redna preventivna škropljenja proti škrlupu. V nasadih, ki še ne cvetijo lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov:

**Dithane M-45 v 0,2 -0,25% konc., Dithane DG NEOTEC v 0,2-0,25% konc., Delan 700 WG v 0,05% konc., Syllit 400 SC v 0,1-0,16 % konc., Merpan 50 WP v 0,2-0,3% konc., Merpan 80 WDG v 0,125- 0,2% konc., Polyram DF v 0,2% konc., Thiram 80 EG v 0,2 % konc., Antracol ali Antracol WG 70 v 0,2% konc., Mythos v 0,1 % konc., Chorus 75 WG v 0,2-0,25 konc. ali Chorus 50 WG v odmerku 0,45 kg/ha**

Pripravkoma **Chorus**,in **Mythos** ali **Clarinet**, je priporočljivo dodati še enega od zgoraj navedenih kontaktnih fungicidov.

V nasadih, ki že cvetijo svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov kot so: **Delan 700 WG v 0,05% konc., Dithane M-45 v 0,2 -0,25% konc., Dithane DG NEOTEC v 0,2-0,25% konc, Kor DG v 0,2-0,25% konc., Polyram DF v 0,2% konc., Antracol ali Antracol WG 70 v 0,2% konc..**

V cvetočih nasadih jablan lahko uporabite tudi pripravke **Manfil 75 WG v odmerku 2 kg/ha, Manfil 80 WP v odmerku 2 kg/ha** in **Penncozeb 75 DG v odmerku 2,5 kg/ha**.

V nasadih jablan, kjer ste v preteklih letih imeli velike težave s pepelasto plesnijo, svetujemo, da naslednje škropljenje opravite s pripravki kot so: **Stroby WG v 0,015 % konc, Zato 50 WG v 0,01% - 0,015 % konc., Zato plus v odmerku 1,9 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha, Domark 100 EC v odmerku 0,3 l/ha ali Topas 100 EC v 0,025 % konc..** Vsem naštetim pripravkom, razen pripravkoma Tercel in Zato plus, je potrebno dodati kontakti fungicid.

V ostalih nasadih proti pepelasti plesni uporabite sredstva na osnovi močljivega žvepla (**Cosan, Kumulus, Kalinosul DF, Pepelin, Vindex 80 WG**), ki jih **v odmerku 3 kg/ha** dodate škropilni brozgi.

### Jabolčna grizlica

Tik pred cvetenjem je čas za obešanje belih lepljivih plošč za spremljanje **jabolčne in hruševe grizlice**. Ena bela plošča velikosti 20x30 cm zadostuje za kontrolo enega hektara nasada. Plošče obesimo čim više v krošnjo, da so dobro vidne.

## HRUŠEV OŽIG

Na območju Renče - Bukovica je bila v tem tednu srednje velika do velika nevarnost za okužbe s **hruševim ožigom**. Priporočamo, da nasade hrušk, kjer so bile v lanskem letu prisotne okužbe ter vse druge nasade pečkarjev na območju žarišč hruševega ožiga, poškopite s pripravkom **Serenade WP v odmerku 2,5 – 4,0 kg/ha** ali pripravkom **Aliette Flash v odmerku 4,0 – 5,0 kg/ha**. Škropljenje izvajamo od začetka cvetenja v 3-4 dnevni razmakih. V ta namen lahko uporabimo tudi pripravek **Blossom protect v odmerku 6 kg/ha**, škropljenje ponavljamo v 2 -5 dnevni razmakih, odvisno od napredovanja cvetenja, vremenskih razmer in infekcijskega pritiska bolezni.

*Pripravila: Mojca Rot*