



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA
Pri hrastu 18, 5000 NOVA GORICA
Tel. :++ 386/05-3351200
Faks:++386/05-3351260

Datum: 08/06/2011

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 08. junija 2011

ŠKROPLJENJE BRESKEV IN NEKTARIN

Zaradi velike količine padavin je potrebno v nasadih breskev in nektarin paziti na redna škropljenja breskev proti **breskovemu škrlupu**. Za te namene lahko uporabimo pripravek **Syllit** v **0,16%** konc. **Kumulus DF** ali **Thiovit Jet** v **0,5%** koncentraciji.

Na feromonske vabe se še vedno lovi veliko metuljčkov **breskovega zavijača**.

Če pred kratkim niste poškropili breskev in nektarin proti omenjenemu škodljivcu je smiselno to narediti. Priporočamo uporabo pripravkov **AFFIRM** v količini 3-4 kg/ha ali **CORAGEN** v količini 0,3 l/ha.

Izjema so le tisti nasadi breskev in nektarin, kjer smo se odločili za uporabo metode zavajanja breskovega zavijača s feromoni **ECODIAN CM** tekom celotne rastne sezone (**dvakratno obešanje disperzorjev**). V takih nasadih je sedaj čas za prvo obešanje feromonskih disperzorjev. Po 40-50 dneh je potrebno postopek obesiti nove disperzorje.

Za podrobnejše informacije o pravilni uporabi ECODIAN-a CM pokličite ustrezne službe na Kmetijsko gozdarskem zavodu v Novi Gorici ali podjetje Karsia d.o.o.

Nekatera naštetna sredstva so čebelam nevarna, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

ČEŠPLJE IN SLIVE

Na feromonske vabe se lovi veliko metuljčkov **češpljevega zavijača**, zato priporočamo uporabo pripravka **CORAGEN** v količini 0,3 l/ha, če seveda tega pred kratkim še niste storili.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina