



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA
Pri hrastu 18, 5000 NOVA GORICA
Tel. :++ 386/05-3351200
Faks:++386/05-3351260

Datum: 12/05/2011

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 12. maja 2011

ŠKROPLJENJE BRESKEV IN NEKTARIN

V nasadih moramo biti pozorni na pojav **listnih uši**. V nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti lahko uporabimo sledeče pripravke: **Chess 50 WP v 0,02% konc.**, **Confidor SL 200 v 0,025% konc.**, **Kohinor SL 200 v 0,025% konc.**, **Tepeki v 0,14kg/ha**, **Mospilan 20 SG v 0,025-0,04% konc.**, **Calypso SC 480 v 0,3l/ha.**, **Actara 25 WG v 0,1-0,125kg/ha** in **Pirimor 50 WG v 0,04-0,06% konc.**

V nasadih breskev in nektarin, kjer so se plodiči že slekli, je potrebno paziti na redna škropljenja breskev proti **breskovemu škrlupu**. Pazljivost je še posebej potrebna v nasadih, ki jih **namakate s pomočjo razpršilcev**.

Za te namene lahko uporabimo pripravek **Syllit v 0,16% konc.** **Kumulus DF** ali **Thiovit Jet v 0,3% koncentraciji**.

Na feromonske vabe se lovi večje število metuljčkov **breskovega zavijača**. Ker so se nočne temperature nekoliko dvignile, v tem času priporočamo uporabo pripravka **MATCH 050 EC v 0,1% konc (poraba zalog do konca letošnjega leta)**. Uporabimo lahko tudi pripravek **STEWART v 0,017% koncentraciji**.

Na ta način bomo vsaj delno vplivali na manjši pojav sledečih generacij breskovega zavijača.

Nekatera naštetna sredstva so čebelarjem nevarna, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

ŠKROPLJENJE ČEŠENJ IN VIŠENJ

V nasadih češenj in višenj pozorno spremljajte pojav **črne češnjeve uši**. Preg škodljivosti je 3% napadenih poganjkov.

Uporabite lahko sredstva: **Neemazal T/S v 0,15% konc.**, **Confidor 200 SL** ali **Kohinor 200 SL** v količini **0,5 l/ha**, ter **Calypso SC 480** v količini **0,375 l/ha**.

PAZITE NA KARENCO UPORABLJENIH PRIPRAVKOV!

Nekatera navedena sredstva so čebelarjem nevarna, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

ČEŠPLJE IN SLIVE

V nasadih bodite pozorni tudi na pojav zelene in mokaste češpljeve uši. V kolikor je prag škodljivosti presežen, lahko po cvetenju uporabite naslednje pripravke: **Confidor 200 SL ali Kohinor 200 SI v 0,025 % konc., Mospilan 20 SG v 0,025- 0,04% konc.. ali Pirimor 50 WG v 0,04 – 0,06 % konc..**

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Pripravil: dr.Ivan Žežlina