



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA  
Pri hrastu 18, 5000 NOVA GORICA  
Tel. :++ 386/05-3351200  
Faks:++386/05-3351260

Datum: 13/04/2011

## Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 13. aprila 2011

### ŠKROPLJENJE BRESKEV IN NEKTARIN

Velika večina nasadov breskev in nektarin je v fazi slačenja plodičev. Ponekod odcvetajo le še sorta Veteran in ostale pozne sorte.

V nasadih, ki so **že odcveteli** moramo biti pozorni na pojav **listnih uši (predvsem na pojav rjave in črne breskove uši)**. V nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti, **škropimo ko odpadejo vsi venčni listi**. Uporabimo lahko sledeče pripravke: **Chess 50 WP v 0,02% konc.**, **Confidor SL 200 v 0,025% konc.**, **Kohinor SL 200 v 0,025% konc.**, **Teppeki v 0,14kg/ha**, **Mospilan 20 SG v 0,025-0,04% konc.**, **Calypso SC 480 v 0,3l/ha.**, **Actara 25 WG v 0,1-0,125kg/ha** in **Pirimor 50 WG v 0,04-0,06% konc.**

**Po cvetenju**, ko odpadejo vsi venčni listi, je pri nektarinah potrebno opraviti škropljenje proti **tripsom**. Za zatiranje tripsov lahko uporabimo pripravka **Confidor SL 200** ali **Kohinor SL 200 v 0,025% konc.** in v skladu z navodili. Pripravki delujejo tudi na listne uši.

**Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.**

### ŠKROPLJENJE MARELIC

V nasadih marelic pozorno spremljajte pojav **malega zimskega pedica**, ki obžira mlade lističe. Še posebej, če imamo nasad v bližini gozda, je potrebno malega zimskega pedica zatirati. Uporabimo lahko sredstvo **Neemazal T/S v 0,15% koncentraciji**. Sredstvo deluje na mlajše razvojne stadije gosenic.

**Omenjeno sredstvo ni strupeno za čebele, priporočamo pa, da z njim škropimo pod noč, ko na cvetovih ni čebel.**

### ŠKROPLJENJE ČEŠENJ IN VIŠENJ

Večina nasadov češenj in višenj je že odcvetelo oziroma so v fazi odcvetanja. V nasadih pozorno spremljajte pojav **malega zimskega pedica**, ki obžira mlade lističe in plodiče češenj. Še posebej, če imamo nasad v bližini gozda, je potrebno malega zimskega pedica zatirati.

Uporabimo lahko sredstvo **Neemazal T/S v 0,15%** koncentraciji. Sredstvo deluje na mlajše razvojne stadije gosenic.

Po cvetenju je potrebno paziti na pojav **črne češnjeve uši**. Preg škodljivosti je 3% napadenih poganjkov.

Uporabite lahko sredstva: **Neemazal T/S v 0,15% konc.**, **Confidor 200 SL** ali **Kohinor 200 SL** v količini **0,5 l/ha**, ter **Calypso SC 480** v količini **0,375 l/ha**.

**Nekatera navedena sredstva so čebelam nevarna, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.**

*Pripravil: dr. Ivan Žežlina*

## **HRUŠKE IN JABLANE**

### **Škrlup in jablanova pepelovka**

Jablane in hruške so v večjem delu Primorske že polnem cvetenju oziroma že odcvetajo. Na Tolminskem in v Brkinih nasadi jablan začenjajo cveteti.

V preteklem tednu ni bilo večje nevarnosti za okužbe s škrlupom. Količine padavin ob zadnjem dežju so bile majhne. Priporočamo, da še naprej izvajate redna preventivna škropljenja proti škrlupu.

Za naslednje škropljenje priporočamo uporabo naslednjih pripravkov: **Delan 700 WG v 0,05% konc.**, **Mythos v 0,1 % konc.**, **Chorus 75 WG v 0,2-0,25 konc.**, **Chorus 50 WG v odmerku 0,45 kg/ha** ali **Clarinet v 0,1 % konc.**. Vsem naštetim pripravkom razen pripravku Delan, je potrebno dati kontaktni fungicid.

V času cvetenja odsvetujemo uporabo pripravkov na osnovi aktivnih snovi **captan** in **dodin**.

V nasadih jablan, kjer ste v preteklih letih imeli velike težave s pepelasto plesnijo, svetujemo, da naslednje škropljenje opravite s pripravki kot so: **Stroby WG v 0,015 % konc**, **Zato 50 WG v 0,01% - 0,015 % konc.**, **Zato plus v odmerku 1,9 kg/ha**, **Tercel v odmerku 2,5 kg/ha**, **Domark 100 EC v odmerku 0,3 l/ha** ali **Topas 100 EC v 0,025 % konc.**. Vsem naštetim pripravkom, razen pripravkoma Tercel in Zato plus, je potrebno dodati kontakti fungicid.

V ostalih nasadih proti pepelasti plesni uporabite sredstva na osnovi močljivega žvepla (**Cosan**, **Kumulus**, **Kalinosul DF**, **Pepelin**, **Vindex 80 WG** ), ki jih v odmerku **3 kg/ha** dodate škropilni brozgi.

### **Jabolčna in hruševa grizlica**

Tik po cvetenju je čas za zatiranje **jabolčne in hruševe grizlice**. V kolikor ste med cvetenjem ujeli več kot 30 osic na belo lepljivo ploščo, svetujemo, da opravite škropljenje. Za zatiranje **jabolčne grizlice** lahko uporabite insekticide kot so: **Actara 25 WG v 0,02% konc.**, **Calypso SC 480 0,02% konc.** ali **Mospilan 20 SG 0,04% konc.**. Za zatiranje **hruševe grizlice** pa sta registrirani sredstvi **Calypso SC 480 0,02% konc.** in **Mospilan 20 SG 0,04% konc.**

**Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.**

## HRUŠEV OŽIG

Na območju Renče - Bukovica je bila v tem tednu velika nevarnost za okužbe s **hruševim ožigom**. Priporočamo, da nasade hrušk, kjer so bile v lanskem letu prisotne okužbe ter vse druge nasade pečkarjev na območju žarišč hruševega ožiga, ponovno poškropite s pripravkom **Serenade WP** v odmerku **2,5 – 4,0 kg/ha** ali pripravkom **Aliette Flash** v odmerku **4,0 – 5,0 kg/ha**. Škropljenje izvajamo od začetka cvetenja v 3-4 dnevni razmakih. V ta namen lahko uporabimo tudi pripravek **Blossom protect v odmerku 6 kg/ha**, škropljenje ponavljamo v 2 -5 dnevni razmakih, odvisno od napredovanja cvetenja, vremenskih razmer in infekcijskega pritiska bolezni.

*Pripravila: Mojca Rot*