



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA  
Pri hrastu 18, 5000 NOVA GORICA  
Tel. :++ 386/05-3351200  
Faks:++386/05-3351260

Datum: 17/06/2011

## Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 17. junija 2011

### ŠKROPLJENJE JABLAN IN HRUŠK

#### Škrlup in pepelasta plesen

V zadnjem tednu so bili pogoji za okužbe s škrlupom izpolnjeni na Tolminske in v Brkinih, kjer je padla manjša količina padavin. Za naslednja škropljenja proti škrlupu svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov kot so: Delan 700 WG v odmerku 0,75 kg/ha, Syllit 400 SC v 0,1-0,16 % konc., Dithane M-45 ali Dithane DG NEOTEC v odmerku 2 kg/ha, Manfil 75 WG ali Manfil 80 WP v odmerku 2 kg/ha, Penncozeb 75 DG v odmerku 2,5 kg/ha, Merpan 50 WP v 0,2-0,3% konc., Merpan 80 WDG v 0,125- 0,2% konc., Polyram DF v odmerku 2 kg/ha, Thiram 80 EG v 0,2 % konc., Antracol ali Antracol WG 70. v 0,2 % konc..

Pri uporabi kontaktnih fungicidov upoštevajte, da je pri 30 mm padavin, delovanje kontaktnega fungicida oslabiljeno, pri 50 mm padavin pa je škropilna obloga bolj ali manj v celoti izprana z listov.

Hruške je potrebno redno škropiti proti **hruševemu škrlupu**. V ta namen lahko uporabite naslednje pripravke: **Dithane M-45 ali Dithane DG NEOTEC v odmerku 2/kg/ha, Polyram v odmerku 2/kg/ha, Delan 700 WG v odmerku 0,75 kg/ha, Syllit 400 SC v 0,1-0,16 % konc., Merpan 50 WP v 0,2-0,3% konc., Merpan 80 WDG v 0,125- 0,2% konc., Thiram 80 WG v 0,2 % konc., Ziram 76 WG v 0,2 – 0,3%, Antracol ali Antracol WG 70 v 0,2 % konc..**

V nasadih jablan, kjer imate težave z jablanovo pepelovko za škropljenje proti škrlupu izbirajte sredstva, ki delujejo tudi na pepelovko. Uporabite lahko naslednje pripravke: **Stroby WG v 0,015 % konc, Zato 50 WG v 0,01% - 0,015 % konc., Zato plus v odmerku 1,9 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha, Domark 100 EC v odmerku 0,3 l/ha, Topas 100 EC v 0,025 % konc. ali Clarinet v 0,1 % konc.** Vsem naštetim pripravkom, razen pripravkoma Tercel in Zato plus, je potrebno dodati kontakti fungicid.

V ostalih nasadih proti pepelovki uporabite sredstva na osnovi močljivega žvepla (**Cosan, Kumulus, Kalinosul DF, Pepelin, Vindex 80 WG**), ki jih **v odmerku 3 kg/ha** dodate škropilni brozgi.

### HRUŠEVA BOLŠICA

V nasadih hrušk se pojavljajo ličinke **hruševe bolšice**, ki povzročajo težave zaradi obilnega izločanja medene rose. Priporočamo škropljenje z enim izmed naštetih pripravkov kot so: **Vertimec 1,8% EC v 0,125% konc., Actara 25 WG v 0,02% konc., Confidor SL 200 ali Kohinor SL 200 v 0,125 % konc., ter Mospilan 20 SG v 0,05% konc.**

Vsem naštetim pripravkom je zaradi boljše oprijemljivosti smiselno dodati 0,25% registriranega oljnega pripravka ali Nu-Film v 0,075% konc.

**Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.**

## **HRUŠEV OŽIG**

Z namenom zgodnjega odkrivanja morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo redno pregledovanje sadovnjakov jablan in hrušk in sadnih vrtov. V primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200). Več informacij na: [http://www.furs.si/svn/zvr/hr\\_ozig.asp](http://www.furs.si/svn/zvr/hr_ozig.asp)

*Pripravila: Mojca Rot*