



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA
Pri hrastu 18, 5000 NOVA GORICA
Tel. :++ 386/05-3351200
Faks:++386/05-3351260

Datum: 18/03/2011

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 18. marca 2011

PREDSPOMLADANSKO ŠKROPLJENJE MARELIC

Temperature so se v zadnjih dneh dvignile, kar vpliva na hitrejši razvoj sadnega drevja.

Marelice že cvetijo. Ko je odprtih približno 10% cvetov je čas, da opravite prvo škropljenje proti **cvetni** oz. **plodovi moniliji**.

Za ta namen so v programu integrirane pridelave registrirani pripravki

Chorus 75 WG v količini **0,2 – 0,5 kg/ha**,

Chorus 50 WG v količini **0,5 – 0,6 kg/ha** in

Rovral aquaflo v količini **1,5 – 2.25 l/ha**.

Omenjena sredstva niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvračalnega učinka z njimi škropimo pod noč, ko na cvetovih ni čebel.

PREDSPOMLADANSKO ŠKROPLJENJE BRESKEV IN NEKTARIN

Vreme se je otopilo, zato breskve in nektarine hitro napredujejo z razvojem.

V večini nasadov je sedaj optimalen čas za škropljenje breskev in nektarin proti **breskovi kodravosti** in **listni luknjičavosti koščičarjev** z organskima fungicidoma kot sta:

Ziram 76 WG v **0,3% konc.** ali

Syllit v **0,16% konc.**

Škropiti je treba temeljito, pri čemur pazimo, da bodo dobro poškopljene tudi vrhovi dreves. Izberemo dan, ko ni vetra in da je po možnosti zračna vlažnost nad 60%.

ŠKROPLJENJE ČEŠENJ IN VIŠENJ

Brsti češenj in višenj se napenjajo, zato je sedaj čas za prvo škropljenje proti **listni luknjičavosti koščičarjev**.

Priporočamo predvsem uporabo sredstev na osnovi bakra kot so: **Champion 50 WG** v **0,5 – 1,0% konc.**, **Cuprablau-Z** v **0,8% konc.**, **Cuprablau-Z ultra** v **0,25 - 0,7% konc.**, **Ramin 50** v **0,5 - 0,75% konc.**, **Bordojska brozga Caffaro** v **0,95 - 1,15% konc.**, **Bordojska brozga Scarmagnan** v **0,95 - 1,15% konc.**, **Modra galica Scarmagnan** v **1,0% konc.**

ŠKROPLJENJE SLIV IN ČEŠPELJ

Nasade sliv in češpelj poškopimo proti **listni luknjčavosti koščičarjev** in drugim boleznim, če tega še nismo naredili. Odganjanje dreves je na posameznih legah zelo različno zato je potrebno upoštevati, da je najprimernejši čas za škropljenje, ko se brsti razprejo.

Za prvo škropljenje uporabimo pripravke na osnovi bakra kot so: **Champion 50 WG v 0,5 – 1,0% konc.**, **Cuprablau-Z v 0,8% konc.**, **Cuprablau-Z ultra v 0,25 - 0,7% konc.**, **Ramin 50 v 0,5 - 0,75% konc.**, **Bordojska brozga Caffaro v 0,95 - 1,15%.**, **Bordojska brozga Scarmagnan v 0,95 - 1,15% konc.**, **Modra galica Scarmagnan v 1,0% konc.**

HRUŠKE IN JABLANE

Hruške so v Vipavski dolini, Goriških Brdih, na Krasu in v Slovenski Istri že v fazi D po Fleckingerju. Priporočamo, da nasade hrušk pred napovedanim dežjem poškopite proti **škr lupu** s kontaktnimi fungicidi kot so:

Dithane M-45 v 0,2 - 0,25% konc., **Dithane DG NEOTEC v 0,2-0,25% konc.**, **Delan 700 WG v 0,05% konc.**, **Syllit 400 SC v 0,1-0,16 % konc.**, **Merpan 50 WP v 0,2-0,3% konc.**, **Merpan 80 WDG v 0,125- 0,2% konc.**, **Polyram DF v 0,2% konc.**, **Thiram 80 EG v 0,2 % konc.**, **Ziram 76 WG v 0,2-0,3 % konc.**, **Antracol ali Antracol WG 70 v 0,2% konc.**

Nasade hrušk na višjih legah ter nasade jablan, ki že začenjajo brsteti, je potrebno poškopiti z bakrenimi pripravki. V ta namen lahko uporabite naslednje pripravke:

Champion 50 WP v 0,25-0,7% konc., **Cuprablau-Z v 0,25-0,8% konc.**, **Cuprablau-Z ultra v 0,25 - 0,7% konc.**, **Ramin 50 v 0,25-0,75% konc.**, **Kupro 190 SC v 0,5-0,75% konc.**, **Bordojska brozga Caffaro v 0,95-1,15% konc.**, **Bordojska brozga Scarmagnan v 0,95-1,15% konc.**, **Modra galica Scarmagnan v 0,95-1,15% konc.** in **Nordox 75 WG v 0,1-0,2% konc.**

Pripravki na osnovi bakra so delno učinkoviti proti **hruševemu ožigu**, zato je njihova uporaba PRIPOROČLJIVA v vseh intenzivnih in travniških nasadih, kot tudi v sadnih vrtovih.

Njihova uporaba je ZELO PRIPOROČLJIVA zlasti na območjih, kjer je bila v prejšnjih letih ugotovljena okužba s **hruševim ožigom**.

POSEBNO OBVESTILO ZA SADJARJE

ZATIRANJE MURVOVEGA IN AMERIŠKEGA KAPARJA

Obveščamo vas, da je bilo tudi letos izdano izjemno dovoljenje za fitofarmacevtsko sredstvo Admiral 10 EC za omejevanje številčnosti populacije **murvovega kaparja na koščičarjih (breskve, marelice in nektarine in ameriškega kaparja na pečkarjih (hruške, jablane).**

Admiral 10 EC lahko uporabljajo le tisti pridelovalci jabolk, hrušk, breskev, marelic in nektarin, ki so vpisani v register pridelovalcev pri MKGP in imajo nasade napadene s tem škodljivcem. Sredstvo **ni v prosti prodaji**, temveč se lahko prodaja neposredno preko podjetja Hmezad Exim d.o.o znanim kupcem, registriranim pri MKGP.

Sredstvo Admiral 10EC lahko naročite pri podjetju Hmezad exim d.d., Vrečerjeva 14, 3313 Žalec. Naročila zbirajo najkasneje do 15. marca 2011. Več informacij v zvezi z naročilom in uporabo Admirala dobite na spletni strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica:

<http://www.kmetijskizavod-ng.si/>

Admiral lahko uporabimo samo 1 krat v rastni dobi, tretiranja pa morajo biti izvedena v času pred cvetenjem in sicer pri breskvah v fenološki fazi BBCH 09, ko so konice zelenih listov 5 mm nad brstnimi luskami oziroma v razvojnem stadiju oplojenih samic murvovega kaparja ter za zatiranje ameriškega kaparja pri jablanah in hruškah v fenološki fazi BBCH 07 do 09, sredstvo deluje na prezimele ličinke I. razvojne.