



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA
Pri hrastu 18, 5000 NOVA GORICA
Tel. :++ 386/05-3351200
Faks:++386/05-3351260

Datum: 15.7.2011

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 15. julija 2011

ŠKROPLJENJE BRESKEV IN NEKTARIN

V nasadih poznih sort breskev in nektarin je potrebno še zadnje škropljenje proti **breskovemu škrlupu**. Še posebej bodite pozorni v tistih nasadih, ki jih namakate in kjer je škrlup že prisoten. Za te namene lahko uporabimo pripravka na osnovi močljivega žvepla kot sta: **Kumulus DF** ali **Thiovit Jet** v **0,5%** koncentraciji.

Let **breskovega zavijača** se je konstanten zato priporočamo, da proti omenjenemu škodljivcu uporabite pripravka **AFFIRM** v količini 3-4 kg/ha ali **CORAGEN** v količini 0,3 l/ha.

Izjema so le tisti nasadi breskev in nektarin, kjer smo se odločili za uporabo metode zavajanja breskovega zavijača s feromoni ECODIAN CM.

Za podrobnejše informacije o pravilni uporabi ECODIAN-a CM pokličite ustrezne službe na Kmetijsko gozdarskem zavodu v Novi Gorici ali podjetje Karsia d.o.o.

Nekatera naštetna sredstva so čebelam nevarna, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Pazite na karenco uporabljenih fitofarmaceutskih sredstev!

ČEŠPLJE IN SLIVE

Tudi v nasadih češpelj in sliv se na feromonske vabe lovi veliko metuljčkov **češpljevega zavijača**, zato priporočamo uporabo pripravka **CORAGEN** v količini 0,3 l/ha, če je od zadnjega škropljenja že minilo tri do štiri tedne. Pripravek Coragen lahko uporabimo dvakrat v rastni sezoni.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina