



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA
Pri hrastu 18, 5000 NOVA GORICA
Tel. :++ 386/05-3351200
Faks:++386/05-3351260

Datum: 29.07.2011

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 29. julija 2011

JABLANE IN HRUŠKE

Škrlup

Jablane in hruške je potrebno redno škropiti proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi kot so: Delan 700 WG v odmerku 0,75 kg/ha, Syllit 400 SC v 0,1-0,16 % konc., Dithane M-45 ali Dithane DG NEOTEC v odmerku 2 kg/ha, Manfil 75 WG ali Manfil 80 WP v odmerku 2 kg/ha, Penncozeb 75 DG v odmerku 2,5 kg/ha, Merpan 50 WP v 0,2-0,3% konc., Merpan 80 WDG v 0,125- 0,2% konc., Polyram DF v odmerku 2 kg/ha, Thiram 80 EG v 0,2 % konc., Antracol ali Antracol WG 70. v 0,2 % konc. ter Bellis v odmerku 0,8 kg/ha.

Za zaključna škropljena proti škrlupu dajemo prednost fungicidom, ki imajo dobro delovanje na skladiščni škrlup in ostale skladiščne bolezni. Taki pripravki so: **THIRAM 80 WG**, ki ima **35 dni karence**, **MERPAN 50 WP**, **MERPAN 80 WDG**, **ZATO** ali **ZATO PLUS**, ki imajo 21 dni karence ter pripravek **BELLIS**, ki ima **7 dni karence**.

Jabolčni zavijač

Ulov **jabolčnega zavijača** je v zadnjem tednu zaradi prehodnih ohladitev manjši. Škropljenje je potrebno v le tistih nasadih, kjer je ste v zadnjem tednu zabeležili večji ulov metuljčkov (več kot 10 /feromonsko vabo /teden) in je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni. Uporabite lahko enega izmed naštetih insekticidov: **Coragen v odmerku 0,27 l/ha**, **Pyrinex v 0,2 % konc.**, **Mospilan v 0,04 % konc.**, **Calypso v 0,02 % konc.** ali **Steward v 0,017% konc.**

Priporočamo, da insekticidu dodate pripravek na osnovi virusa granuloze **MADEX** v odmerku 0,05 l/ha. To je dodaten ukrep za slabitev populacije jabolčnega zavijača, še posebej priporočljiv za tiste sadovnjake, v katerih vam je v preteklih letih zavijač povzročal veliko škodo. Pripravek MADEX na svetlobi hitro razpada, zato opravite škropljenje v večernem času.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda. Pazite na karence uporabljenih fitofarmaceutskih sredstev!

HRUŠEV OŽIG

Z namenom zgodnjega odkrivanja morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo redno pregledovanje sadovnjakov jablan in hrušk in sadnih vrtov. Še posebej bodite pozorni v tistih nasadih, ki jih je prizadela toča. V primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200). Več informacij na: http://www.furs.si/svn/zvr/hr_ozig.asp

Pripravila: Mojca Rot