



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA
Pri hrastu 18, 5000 NOVA GORICA
Tel. :++ 386/05-3351200
Faks:++386/05-3351260

Datum: 22/04/2011

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 21. aprila 2011

ŠKROPLJENJE BRESKEV IN NEKTARIN

Velika večina nasadov breskev in nektarin je v fazi slačenja plodičev.

V nasadih moramo biti pozorni na pojav **listnih uši (predvsem na pojav rjave in črne breskove uši)**. V nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti lahko uporabimo sledeče pripravke: **Chess 50 WP v 0,02% konc.**, **Confidor SL 200 v 0,025% konc.**, **Kohinor SL 200 v 0,025% konc.**, **Teppeki v 0,14kg/ha**, **Mospilan 20 SG v 0,025-0,04% konc.**, **Calypso SC 480 v 0,3l/ha.**, **Actara 25 WG v 0,1-0,125kg/ha** in **Pirimor 50 WG v 0,04-0,06% konc.**

Skrajni čas je, da pri nektarinah opravimo škropljenje proti **tripsom**. Za zatiranje tripsov lahko uporabimo pripravka **Confidor SL 200** ali **Kohinor SL 200 v 0,025% konc.** in v skladu z navodili. Pripravki delujejo tudi na listne uši.

Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

Ko se bodo plodiči breskev slekli, bo potrebno paziti na redna škropljenja breskev proti **breskovemu škrlupu**.

Škropljenje je smiselno pred naslednjim napovedanim dežjem. Za te namene lahko uporabimo pripravek **Syllit v 0,16% konc.** **Kumulus DF** ali **Thiovit Jet v 0,3% koncentraciji**.

ŠKROPLJENJE ČEŠENJ IN VIŠENJ

V nasadih češenj in višenj pozorno spremljajte pojav **črne češnjeve uši**. Preg škodljivosti je 3% napadenih poganjkov.

Uporabite lahko sredstva: **Neemazal T/S v 0,15% konc.**, **Confidor 200 SL** ali **Kohinor 200 SL** v količini **0,5 l/ha**, ter **Calypso SC 480** v količini **0,375 l/ha**.

Nekatera navedena sredstva so čebelarjem nevarna, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

ČEŠPLJE IN SLIVE

Tik po cvetenju je čas za zatiranje **češpljevih grizlic**. V kolikor ste med cvetenjem ujeli več kot 30 osic na belo lepljivo ploščo, svetujemo, da opravite škropljenje. Za zatiranje **češpljevih grizlic** lahko uporabite pripravek **Mospilan 20 SG 0,04% konc.**

V nasadih bodite pozorni tudi na pojav zelene in mokaste češpljeve uši. V kolikor je prag škodljivosti presežen, lahko po cvetenju uporabite naslednje pripravke: **Confidor 200 SL ali Kohinor 200 SL v 0,025 % konc., Mospilan 20 SG v 0,025- 0,04% konc.. ali Pirimor 50 WG v 0,04 – 0,06 % konc..**

Pripravka **Confidor** in **Kohinor** delujeta tudi na tripse ali resarje, ki povzročajo rjavenje pokožice češpelji in sliv.

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Pripravil dr. Ivan Žežlina