

## Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 22. marec 2011

Datum: 22. marec 2011

### ZATIRANJE MURVOVEGA IN AMERIŠKEGA KAPARJA

V nasadih breskev in nektarin, kjer se je prerazmnožil **murvov kapar** ter v nasadih **jablan in hrušk**, kjer imate težave z **ameriškim kaparjem**, je sedaj primeren čas za zatiranje omenjenih škodljivcev. Za ta namen ima izjemno dovoljenje za uporabo pripravka **Admiral 10 EC**.

**Admiral 10 EC** lahko uporabljajo le tisti pridelovalci, ki so vpisani v register pridelovalcev pri MKGP in imajo nasade napadene s tem škodljivcem. Sredstvo ni v prosti prodaji, temveč se lahko prodaja neposredno preko podjetja Hmezad d.o.o. Pridelovalci so dolžni voditi evidenco o uporabi tega sredstva.

**Admiral** lahko uporabite **samo 1 krat v rastni dobi** in sicer **v času pred cvetenjem**:

- **pri breskvah in nektarinah** v fazi BBCH 07 do 09, ko so konice zelenih listov 5 mm nad brstnimi luskami oz. v razvojnem stadiju oplojenih samic murvovega kaparja, v odmerku 35 do 40 ml na 100 l vode pri izhodiščni porabi vode 800 l/ha, največji dovoljeni odmerek pa je 0,32 l/ha.
- **pri jablanah in hruškah** se lahko uporabi v razvojni fazi BBCH 07 do 09 v odmerku 40 ml na 100 l vode, pri izhodiščni porabi vode 800 l/ha, največji dovoljeni odmerek pa je 0,32 l/ha. Sredstvo deluje na prezimele ličinke I. stopnje.

**Sredstvo je strupeno za čebele, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.** Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.