



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA  
Pri hrastu 18, 5000 NOVA GORICA  
Tel. :++ 386/05-3351200  
Faks:++386/05-3351260

Datum: 26/05/2011

## Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 26. maja 2011

### ŠKROPLJENJE BRESKEV IN NEKTARIN

V nasadih breskev in nektarin, ki so namakani s pomočjo klasičnega oroševanja nad krošnjo, je potrebno paziti na redna škropljenja breskev proti **breskovemu škrlupu**. Za te namene lahko uporabimo pripravek **Syllit** v **0,16%** konc. **Kumulus DF** ali **Thiovit Jet** v **0,5%** koncentraciji.

V nasadih moramo biti pozorni na pojav **listnih uši**. V nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti lahko uporabimo sledeče pripravke: **Chess 50 WP** v **0,02%** konc., **Confidor SL 200** v **0,025%** konc., **Kohinor SL 200** v **0,025%** konc., **Tepeki** v **0,14kg/ha**, **Mospilan 20 SG** v **0,025-0,04%** konc., **Calypso SC 480** v **0,3l/ha.**, **Actara 25 WG** v **0,1-0,125kg/ha** in **Pirimor 50 WG** v **0,04-0,06%** konc.

Na feromonske vabe se znova lovi veliko metuljčkov **breskovega zavijača** (predvidoma **2. generacija**).

Priporočamo uporabo pripravkov **AFFIRM** v količini 3-4 kg/ha ali **CORAGEN** v količini 0,3 l/ha.

**Nekatera naštetna sredstva so čebelam nevarna, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.**

**Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.**

### ŠKROPLJENJE ČEŠENJ IN VIŠENJ

V proizvodnih nasadih poznih sort češenj je še čas za zatiranje **češnjeva muha**. **Zatiranje je možno pri sortah, ki bodo zorele v sredini junija (od sorte Lapins naprej)**. V integrirani pridelavi je dovoljena uporaba kontaktnega sredstva **Spada 200 EC** v **0,25 – 0,30%** konc., ki ima **10 dni karence** in sredstva **Mospilan 20 SG** v količini **0,375 kg/ha**, ki ima **14 dni karence**.

Za zatiranje češnjeve muhe lahko uporabimo tudi pripravek **Naturalis**, ki je izdelan na osnovi glive *Beauveria bassiana* in spada med t.i. biološke pripravke ter nima karence. Uporablja se v 0,15% koncentraciji. Uporabiti pa ga je potrebno vsaj trikrat zaporedoma v 4 do 7 dnevni razmikih od časa spreminjanja barve iz rumene v rdečkasto. Njegova uporaba je smiselna pri ekološki pridelavi. Na vrtovih škropljenje odsvetujemo, priporočamo pa obešanje rumenih lepljivih plošč, na katere se lovi češnjeva muha. Na vsako drevo obesimo vsaj 10 plošč, in sicer bolj na gosto na vzhodno in južno stran krošnje. Ko češnje oberemo, rumene kartone odstranimo, ker se sicer nanje lovijo tudi nekatere koristne žuželke.

### PAZITE NA KARENCO UPORABLJENIH PRIPRAVKOV!

**Nekatera navedena sredstva so čebelam nevarna, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.**

## ČEŠPLJE IN SLIVE

V nasadih bodite pozorni tudi na pojav zelene in mokaste češpljeve uši. V kolikor je prag škodljivosti presežen, lahko po cvetenju uporabite naslednje pripravke: **Confidor 200 SL ali Kohinor 200 SI v 0,025 % konc., Mospilan 20 SG v 0,025- 0,04% konc.. ali Pirimor 50 WG v 0,04 – 0,06 % konc.**

Na feromonske vabe se lovi veliko metuljčkov **češpljevega zavijača**.

Priporočamo uporabo pripravka **CORAGEN** v količini 0,3 l/ha.

**Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.**

*Pripravil: dr. Ivan Žežlina*