



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA
Pri hrastu 18, 5000 NOVA GORICA
Tel. :++ 386/05-3351200
Faks:++386/05-3351260

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 28. aprila 2011

ŠKROPLJENJE BRESKEV IN NEKTARIN

V nasadih moramo biti pozorni na pojav **listnih uši**. V nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti lahko uporabimo sledeče pripravke: **Chess 50 WP v 0,02% konc.**, **Confidor SL 200 v 0,025% konc.**, **Kohinor SL 200 v 0,025% konc.**, **Tepeki v 0,14kg/ha**, **Mospilan 20 SG v 0,025-0,04% konc.**, **Calypso SC 480 v 0,3l/ha.**, **Actara 25 WG v 0,1-0,125kg/ha** in **Pirimor 50 WG v 0,04-0,06% konc.**

Sredstva so čebelarjem nevarna zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

V nasadih breskev in nektarin, kjer so se plodiči že slekli, je potrebno paziti na redna škropljenja breskev proti **breskovemu škrlupu**.

Za te namene lahko uporabimo pripravek **Syllit v 0,16% konc.** **Kumulus DF** ali **Thiovit Jet v 0,3% koncentraciji**.

ŠKROPLJENJE ČEŠENJ IN VIŠENJ

V nasadih češenj in višenj pozorno spremljajte pojav **črne češnjeve uši**. Preg škodljivosti je 3% napadenih poganjkov.

Uporabite lahko sredstva: **Neemazal T/S v 0,15% konc.**, **Confidor 200 SL** ali **Kohinor 200 SL** v količini **0,5 l/ha**, ter **Calypso SC 480** v količini **0,375 l/ha**.

Nekatera navedena sredstva so čebelarjem nevarna, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

ČEŠPLJE IN SLIVE

Po cvetenju je čas za zatiranje **češpljevih grizlic**. V kolikor ste med cvetenjem ujeli več kot 30 osic na belo lepljivo ploščo, svetujemo, da opravite škropljenje. Za zatiranje **češpljevih grizlic** lahko uporabite pripravek **Mospilan 20 SG 0,04% konc.**

V nasadih bodite pozorni tudi na pojav zelene in mokaste češpljeve uši. V kolikor je prag škodljivosti presežen, lahko po cvetenju uporabite naslednje pripravke: **Confidor 200 SL ali Kohinor 200 SI v 0,025 % konc., Mospilan 20 SG v 0,025- 0,04% konc.. ali Pirimor 50 WG v 0,04 – 0,06 % konc..**

Pri uporabi pripravkov, ki so strupeni za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Pripravil: dr. Ivan Žežlina