


*Datum: 29.7.2011*

## LETNA REZ ČEŠENJ IN MARELIC

### 1. Letna rez češenj

Za rodna drevesa češenj je letna rez zelo pomembna. Z njo lahko pričnemo po končani prvi rasti, to se pravi v mesecu avgustu, lahko tudi prve dni septembra. Cilj rezi je osvetlitev krošnje, ki omogoči obraščanje in tudi rodnost v notranjosti.



Izrežemo premočne in prenavpične veje na vrhu drevesa. Če imamo pregosto krošnjo, lahko poredčimo tudi ogrodne veje v notranjosti krošnje. Na ogrodnih vejah izrezujemo navpično rastoče veje ali vejice. Vejice, ki imajo še listne ali cvetne brste pri osnovi izrezujemo na 10 - 20 centimetrskе čepе, ki bodo še nekaj časa rodili. Pokončno rastoče konice ogrodnih vej odvajamo - to se pravi odrežemo na bolj položno rastoče poganjke. Pri starejših drevesih s povešenimi vejami te veje spodrezujemo, kar pomeni, da odrežemo povešeni del veje na nekoliko bolj navzgor rastoče poganjke.

Vse večje rane, ki nastanejo pri rezi, namažemo z eno od past za premazovanje ran. Pri tej rezi pazimo, da ne odstranimo več kot 50 % listne mase.

Na eno do triletnih drevesih praktično ne izvajamo letne rezi, ampak samo razpiranje vej do kota 45-80 stopinj od navpičnice pri palmeti in piramidi in 90 do 120 ° pri solaxu.

V intenzivnih nasadih v katerih je bila izvedena močnejša zimska ali spomladanska rez tik pred cvetenjem, moramo sedaj porezati navpično rastoče bohotivke. Če imajo ti poganjki

pri osnovi cvetne brste (okrogli debeli brsti) režemo nad cvetnimi brsti, če pa nimajo cvetnih brstov odrežemo pri osnovi. Pri zelo rodni sortah, ki dajo predrobne plodove, lahko režemo tudi povešene šibke vejice s cvetnimi šopki na dva do tri cvetne šopke.

## 2. Letna rez marelic

Tudi marelice v rodnosti obrezujemo podobno kot češnje. Skrbeti moramo, da imamo dovolj enoletnega lesa, majskih kitic ter cvetnih rozet, na katerih dobimo rodnost. Pri rezi moramo upoštevati tudi sorto.

Različne sorte rodijo na različnem lesu in glede na tip rodnosti razdelimo sorte v tri skupine:

1. Sorte, ki rodijo na vseh tipih rodnega lesa vključno s predčasnimi poganjki so: Tiryntos, Boccuccia, Palumella, San Castrese, Portici, Bella di Imola, Aurora, Harcot, Laycot.
2. Sorte, ki rodijo predvsem na rozetah, malo na majskih kiticah in redko na rodni šibah so: Antonio Errani, Sungiant, Cafona.
3. Sorte, ki rodijo predvsem na rozetah, na majskih kiticah in na predčasnih poganjkih so: Reale d'Imola, Bergeron.

Rez marelic se mora prilagajati tipu rodnosti posameznih sort. Pri tretji skupini je potrebno krajšati vse rodne šibe takoj po obiranju, da dobimo predčasne poganjke, ki bodo rodili. Pri drugi skupini preredčimo enoletne šibe, da na preostalih v naslednjem letu stimuliramo razvoj rozet in majskih kitic. Pri prvi skupini preredčimo krošnjo in odstranjujemo nad 4 leta star rodni les, na katerem dobimo plodove slabše kvalitete.

Tudi pri gojenju prva leta več razpiramo kot režemo razen tam, kjer želimo z rezjo doseči večje obraščanje. Tako rez izvajamo tik pred začetkom vegetacije, ali pa se poslužujemo pinciranja - odstranjevanja vršičkov v juniju.

Pri tistih sortah iz novejšega sortimenta, ki nastavijo preveč rodnega lesa, bo treba izvajati tudi klasično zimsko rez tik pred cvetenjem, ki je še najbolj podobna rezi breskev in s katero zmanjšamo količino rodnega lesa in dobimo debelejšje plodove. Za primerno debelino plodov je potrebno tudi ustrezno redčenje.

Po ustrezni zimski rezi opravimo poleti predvsem rez bohotivk – navpično rastočih poganjkov. Te praviloma izrezujemo v celoti; na mestih, kjer ni vej in bi želeli obraščanje, lahko tak poganjek upognemo z roko in ohranimo kot vejo ali odrežemo na reznik.

Pri češnjah in marelicah, ki jih ne bomo rezali, se nam bo rodnost selila na obod krošnje in navzgor, slabšala se bo kvaliteta in pridelovanje bo postajalo vedno dražje.

*Pripravil:*

Svetovalec – specialist za sadjarstvo  
Ivan Kodrič, univ. dipl.inž.kmet.