

**SEZNAM HRBICIDOV PO VZNIKU KORUZE 2018**

**SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDO, KI JIH UPORABLJAMO PO VZNIKU KORUZE IN PLEVELOV, 3. 5. 2018**

PRIPRAVEK	ODMERE K /ha	DELOVANJE NA, UPORABA	OPOMBE
<b>BROMOTRIL 225 EC</b> bromoksinil oktanoat 32,75%	<b>1 – 1,5 l/ha</b>	pri fazi 2 – 4 liste koruze za širokolistne semenske plevele	po vzniku posevka, <b>za ambrozijo</b>  <b>Zaloge v uporabi do 12.8.2019</b>
<b>AKRIS *</b> Dimetenamid 28% + terbutilazin 25%	<b>3 l/ha</b>	Od 2. do 6. Lista koruze Za enoletne ozko in širokolistne plevele	
<b>CAMBIO *</b> Bentazon 32% + dikamba 9%	<b>2 l/ha lahko dodamo MOČILO</b>	v fazi 2 – 7 listov, za širokolistne (enoletne in večletne) plevele	dobro deluje na slak in osat, <b>za ambrozijo</b>
<b>BASAGRAN 480*, BASAGRAN bentazon 48%</b>	<b>1,5 – 2 l/ha</b>	V fazi 1 – 5 listov koruze za širokolistne semenske	Ne deluje na slak slabše na ambrozijo
<b>HERBOCID</b> 2,4-D DMA 55,9%	<b>1 – 1,5 l/ha</b>	pri fazi 2 – 4 liste koruze oz. 15- 20 cm za širokolistne plevele, slak osat, <b>za ambrozijo.</b>	lahko v kombinaciji z drugimi herbicidi.  Zaloge v uporabi do 1.7.2018
<b>ESTERON</b> 2,4 D 2-EHE 90,5%	<b>1 l/ha</b>	pri fazi 4 – 6 list koruze za širokolistne plevele, <b>za ambrozijo</b>	
<b>MUSTANG 306 SE 2,4-D 2-EHE</b> 45,242% + florasulam 6,25%	<b>0,5 – 0,6 l/ha</b>	do 4 – 5 lista koruze, za širokolistne plevele, slak in osat, <b>za ambrozijo</b>	
<b>ELUMIS *</b> mezotrion –7,5% + Nikosulfuron – 3%	<b>Do 1,5 l/ha</b>	Po vzniku od 2-8 listov koruze, za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevla. Datum veljavnosti 31.5.2018	
<b>LAUDIS</b> tembotrion 4,4 %	<b>1,15 – 2,25 l/ha</b>	Za širokolistne in nekatero ozkolistne plevele, pri 2 – 8 listu koruze	V komb. s herbicidi proti travnim plevelom Omejitev pri kolobarju!

<b>LAUDIS WG 30</b> tembotrion 20 %	<b>0,25 – 0,5 kg/ha + močilo</b>	Za širokolistne in nekatere ozkolistne plevela, pri 2 – 8 listu koroze	V komb. s herbicidi proti travnim plevelom , Omejitve pri kolobarju!
<b>LONTREL 100</b> * Klorpiralid 10%	<b>1 – 1,2 l/ha</b>	za širokolistne plevela v fazi 2 – 5 lista	osat, <b>pelinol. ambrozija</b> , kamilice in slak. Omejitve pri kolobarju
<b>PEAK 75 WG</b> prosulfuron 75%	<b>20 – 30 g/ha + močilo</b>	širokolistni pleveli, slak, kislice in osat , <b>za ambozijo</b>	
<b>STARANE 2 ali TOMIGAN 200 EC</b> - fluoksipir 1- MHE 28,8 %	<b>0,8 l/ha</b>	v fazi 3 – 6 listov, za nekatere širokolistne plevela (kislice,robide)	Tudi slak , robido NE na kraških območjih ! STARANE 2 in TOMIGAN 200 EC: Zaloge v uporabi do 18.5.2018
<b>STARANE FORTE</b> Fluoksipir 33,3%	<b>0,54 L/ha</b>	V fazi 2-6 listov koroze Za širokolistne plevela: plezajoča lakota, breskova dresen, navadna zvezdica, rogovilček, njivski slak.	Njivski slak lahko tretiramo točkovno, ko je koroza 30-100 cm visoka ob obvezni uporabi ščitnika.  Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.
<b>TANDUS 200 EC</b> fluoksipir 20%	<b>1 l/ha</b>	v fazi 3 – 6 listov, za nekatere širokolistne plevela (kislice,robide)	Tudi slak
<b>BANVEL 480 S *</b> Dikamba -48 %	<b>0,6 l/ha</b>	za širokolistne (enoletne in večletne) pri fazi 2 – 8 list koroze	dobro deluje na slak, <b>za ambrozijo</b>
<b>KALIMBA, DICASH</b> Dikamba- 48 %	<b>0,6 l/ha</b>	Za zatiranje širokolistnega plevela <b>V fazi od 2. do 8 lista koroze, najboljše od 3 – 5 lista koroze</b>	Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28°C, <b>za ambrozijo</b>
<b>ARRAT *</b> Dikamba - 50 % Tritosulfuron - 25%	<b>0,2 kg/ha</b>	od 2 – 8 listov koroze  Za širokolistne plevela	Tudi na slak, <b>za ambrozijo</b> . Priporočeno dodajanje močila DASH HC 1L/ha

<b>ALISEO*</b> Nikosulfuron 30% + rimosulfuron- 15%	<b>70 g/ha</b> + <b>močilo</b> <b>Trend 90</b>	Od 2. do 8. lista koruze	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevela
<b>ALISEO PLUS *</b> Dikamba 60,52%+ Nikosulfuron 9,2% + Rimosulfuron 2,3%	<b>350 – 440</b> <b>g/ha</b> + <b>Močilo</b> <b>Trend 90</b> v 0,1%	Od 2. do 6. lista koruze	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevela. V času tretiranja mora biti listje suho, hkrati pa najmanj 3 ure ne sme deževati.
<b>ARIGO</b> Mezotrion 36% + Nikosulfuron 12% + rimosulfuron 3%	<b>330 g/ha</b> + <b>močilo</b> <b>Trend 90</b> v 0,1%	Od 2. do 8. lista koruze	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne plevela Datum veljavnosti 31.5.2018
<b>HARMONY 50</b> <b>SX</b> tifensulfuron - metil 50%	<b>22,5 g/ha</b> + <b>močilo</b>	pri fazi 2 – 8 listov koruze, za zatiranje širokolistnih plevelov	tudi za ščir in metlike.
<b>EQUIP</b> Foramsulfuron- 2,25%	<b>2 – 2,5</b> <b>l/ha</b> <b>Močilo je</b> <b>že</b> <b>dodano!</b>	za travne in enoletne širokolistne plevela; v fazi 2 – 6 listov koruze	tudi za slak, osat, d. sirek, pl. Pirnica, za <b>ambrozijo</b> .
<b>MAISTER OD</b> Foramsulfuron- 3% jodosulfuron.-metil natrij- 1%	<b>1,5 l/ha</b>	ozkolistni in širokolistni pleveli v  fazi 2 – 6 listov koruze	tudi za slak, za <b>ambrozijo</b>
<b>TAROT 25 WG *</b> rimisulfuron 25 %	<b>40 – 60</b> <b>g/ha</b> + <b>močilo</b>	<b>Od 2. do 8. lista koruze</b> <b>za travne plevela</b> in nekatere širokolistne, divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči, ščir, abutilon	
<b>MOTIVELL* ali</b> <b>SAMSON 4 SC*</b> <b>ali BANDERA *</b>  Nikosulfuron – <b>4%</b>	<b>1 l/ha</b>	<b>za travne plevela</b> tudi divji sirek, pirnica, kostreba in <b>za nekat. enoletne</b> <b>širokolistne plevela</b> 3 – 8. list koruze	ne deluje na slak ,za ščir, slabše na ambrozijo  V kombinaciji s herbicidi za širokolistne plevela !
<b>KELVIN* ali KELVIN</b> <b>OD*</b> Nikosulfuron – 4%	<b>1l/ha</b>	za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevela, 3 – 6. list koruze	
<b>NICOSH* ali</b> <b>PRIMERO*</b> Nikosulfuron – 4%	<b>1l/ha</b>	za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevela, 3 – 6. list koruze	

<b>SAMSON EXTRA 6 OD* ali MILAGRO EXTRA 6OD* ali MOTIVELL EXTRA 6 OD*</b> Nikosulfuron – 6%	<b>0,75 l/ha</b>	<b>Po vzniku od 2-8 listov koruze</b> , za travne plevele tudi divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči in za nekatere enoletne širokolistne plevele. Ne uporablja se jih v sladki koruzi	
<b>ENTAIL* ali MILAGRO 240 SC*</b> Nikosulfuron – 24%	<b>0,17 l/ha</b>	<b>Po vzniku od 2-8 listov koruze</b> , selektivnost za koruzo je najboljša <b>od 3- 5 lista koruze</b> za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela	
<b>TALISMAN</b> Nikosulfuron – 4%	<b>1,125 l/ha</b>	za travne in za nekatere enoletne širokolistne plevele, <b>3 – 6. list koruze</b>	
<b>CLIOPHAR 600 SL</b> Klopiralid 60%	<b>0,16-0,2 l/ha</b>	Za zatiranje širokolistnega plevela V fazi od 2 do 5 listov koruze	Dobro zatira kamilico, osate
<b>MONSOON ACTIVE</b> Foramsulfuron 3% + tienkarbazon-metil 1%	<b>1,5 l/ha ali 0,75 + 0,75 l/ha</b>	Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel	Mogoča deljena aplikacija
	<b>2 l/ha ali 1 + 1 l/ha</b>	Divji sirek	Uporaba v fazi od 2-6 list koruze
<b>OSORNO, TEMSA SC</b> Mezotrion 10%	<b>1,5 l/ha</b>  Uporaba v fazi od 2 do 8 listov na koruzi	<b>Za zatiranje nav. kostrebe in enoletnega širokolistnega plevela</b> , njivske vijolice, <b>ambrozije</b> , plezajoče lakote in nav. slakovec	<b>OSORNO IN TEMSA SC</b> datum veljavnosti 31.5.2018
<b>CAPRENO</b> Tembotrion 34,5% + tienkarbazon-metil 6,8%	<b>0,3 L/ha + močilo na osnovi demetiliranega repičinega olja</b> Uporaba v fazi 2-6 listov koruz	Zatira dresni, belo metliko, pasje zelišče, kamilico, nav. kostrebo, zeleni muhvič, srhodlak. ščir, nav. slakovec	S sredstvom se lahko tretira, ko so rastline suhe. Sredstvo lahko uporabimo samo 1x v rastni dobi. Kolobarne omejitve !
<b>NIKITA</b> Dikamba 31,5% + Mezotrion 15% + nikosulfron 10%	<b>0,45 kg/ha</b>	Po vzniku koruze v fazi, ko ima koruza razvitih od 2 do 9 listov	Enoletni ter večletni širokolistnega in ozkolistni pleveli, <b>za ambozijo</b>
<b>SPANDIS</b> Dikamba 40% + Nikosulfron 10% + prosulfron 4%	<b>0,4 kg/ha</b>	Uporaba, ko sta 2 lista razvita, do razvojne faze, ko je 8 list razvit <b>za ambozijo</b>	Za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela

Pripravila: A. Poženel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;  
 Vir: Seznam registriranih fitofarmaceutskih sredstev na dan 3.5.2018, MKGP, URSVHVVR