

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri pridelovanju poljščin z dne 10. julij 2018

VARSTVO KROMPIRJA

VARSTVO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans de Bary*)

V Vipavski dolini in v Slovenski Istri so rani krompir že izkopali, pozne sorte so odcvetele in debelijo gomolje, drugod v višjih območjih Primorske, so nasadi krompirja strnili vrste in pozne sorte cvetijo. Deževno in toplo vreme v preteklih dneh predstavlja **idealne pogoje za širitev krompirjeve plesni**, ki je na nekaterih nezaščitanih nasadih krompirja že povzročila rjavenje listov in propad cime.

V primeru nadaljevanja nestanovitnega vremena (**plohe, nevihte**), **se bodo odlični pogoji za širjenje krompirjeve plesni nadaljevali. Krompir je potrebno pred dežjem zaščititi proti krompirjevi plesni s sistemiki ali polsistemiki** (glej Varstvo rastlin/Poljščine/ 16.5.2018), sicer sledi izbruh bolezni in propad cime ter posledično gnitje gomoljev.

V primeru, ko opazimo v nasadu **posamezne liste ali rastline napadene s krompirjevo plesnijo** priporočamo škropljenje s fungicidi na osnovi **dimetomorfa** (Acrobat, Forum, Banjo forte, Orvego) **ali cimoksanila** (Antracol combi, Moximate, Nautile, Equation pro, Tanos, Sacron) in ponovitev škropljenja po 5 dneh. **Enako ravnajte v primeru poškodb nasada zaradi toče.**

Za ekološko zaščito krompirja nadaljujte z uporabo dovoljenih BAKRENIH PRIPRAVKOV.

Škropljenja ponavljamo v skladu z navodili za uporabo FFS. Priporočamo, da sredstva s sistemskim in polsistemskim delovanjem menjujete, da se izognete pojavi odpornosti! **Pri izkopu ranega krompirja pazite na karenci!**

V primeru, da je večina listov propadla zaradi krompirjeve plesni, priporočamo odstranitev cime s površine krompirišča. Z izkopom počakamo 7 – 10 dni, dokler se pokožica na gomoljih ne utrdi, da se izognemo še dodatni okužbi gomoljev.

Pripravila: Anka Poženeš, univ.dipl.inž.agr.